

ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER

FULVİK ASİT VOXFUL

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
ORGANİK MADDE	% 70
TOPLAM (HUMİK + FULVİK) ASİT	% 65
FULVİK ASİT	% 65
MAKSİMUM NEM	% 7
SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUM OKSİT (K ₂ O)	% 0,1
pH	6-8



Katı haldeki işlenmiş doğal leonarditin potasyum hidroksit ile çözündürülmesi ve asit ile işleme tabi tutularak elde edilen üründür.

DİKKAT

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
ÇOCUKLARDAN VE GIDA MADDELERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
DERİ VE GÖZ TEMASINDAN KAÇININIZ.
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ.
ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.

Bakanlık Lisans No:
Bakanlık Tescil No:
Üretim tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:

Net Ağırlık: 1 kg

DEPOLAMA DURUMU:

Kuru şartlar altında (minimum -5°C ile maksimum +45°C) depolandığı taktirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Serin ve kuru alanlarda, gıda ve yiyeceklerden, su kaynaklarından uzak yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.



Piyasaya sunacağımız VOXFUL adlı ürünün etiketinin Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığını ve piyasada bu ürünü kullanıldığını beyan eder, aksi taktirde 4703 Sayılı Kanun gereğince yapılacak tüm soruşturma ve cezai müeyyideleri kabul ederiz.

KULLANIM YERLERİ VE DOZLARI:

KULLANILACAK BİTKİ	KULLANIM DOZLARI		KULLANIM ZAMANI
	Damlama, Yağmurlama veya Sprinkten	Yapraktan Püskürtme	
SERA SEBZELERİ (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Marul, Fasulye, Karpuz, Kavun, v.s.)	250-500 gr /da	80-100 gr / 100 Lt su	Fide dikiminden hemen sonra ve bitki gelişimi zayıf ise
MARUL, LAHANA, İSPANAK, KARNABAHAAR, v.s.	250-500 gr /da	80-100 gr / da	İlk uygulama 4-5 yapraklı iken, 10-15 gün ara ile 4-5 kez uygulanır.
PATATES	250-500 gr /da	80-100 gr / da	Yumru teşekkülü başlarken 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Pamuk, Tütün, v.s.)		80-100 gr / da	Bitki gelişim dönemi ve Meyve bağladığı dönemlerde
AÇIK TARLA SEBZELERİ (Domates, Biber, v.s.)	250-500 gr /da	80-100 gr / da	Fide dikiminden hemen sonra ve Bitki gelişim dönemi ve Meyve bağladığı dönemlerde
MEYVE AĞAÇLARI (YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİLERDE), ZEYTİN, KIVI	Ağaç yaşına göre: 50-100 gr / ağaç başı	80-100 gr / 100 Lt su	Gözler patladığında, taç yapraklar döküldüğünde, meyve gelişim döneminde
MUZ	250-500 gr /da	80-100 gr / 100 Lt su	İmardan (onarım) hemen sonra ve hevenk (dal) doğumundan önce
BAĞ	250-500 gr /da	80-100 gr / 100 Lt su	Gözler patladığında, çiçeklenme devresinde, meyve gelişim döneminde
NARENCİYE VE NAR	Ağaç yaşına göre: 50-100 gr / ağaç başı	80-100 gr / 100 Lt su	Çiçek öncesi, çiçek sonrası, meyve gelişim döneminde
PANCAR	500 gr /da	80-100 cc / da	Kök büyümesi başladığında, şeker birikimi başladığında, hasattan 1-1,5 ay önce
HUBUBAT		80-100 gr / da	Sapa kalkma ve Kardeşlenme sonunda
MISIR	250-500 gr /da	80-100 gr / da	İlk uygulama 6-8 yapraklı iken, 10-15 gün sonra tekrarlanır.

*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.

TAŞIMA TALİMATI:

Elle taşıma esnasında eldiven giyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. Gübre ile temas eden vücut kısımlarını bol su ile yıkayınız.

FİRMA BEYANI:

Ürünün ambalajında verilmiş olan bilgiler, analizi ile sınırlı olup kullanımı ise kontrolümüz dışındadır. Bu sebepten dolayı satıcı, kullanımdan veya depolanmasından doğan herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Talimatımız dışındaki kullanımlar için ön deneme yapılması tavsiye edilir.

Üretici Firma:

ASKA Zirai İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Kazım Dirik Mah. 184 Sok. No:60/2

35040 Bornova/İZMİR

Tel: +90 232 343 58 58 Fax: +90 232 342 22 42

aska@askazirai.com

www.askazirai.com

ASKA ZİRİ AİLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
184 Sokak No: 60/2 35040 BORNova - İZMİR
Tel: +90 232 343 58 58 (R.B.) Fax: +90 232 342 22 42
Çakabey V.D. 086 080 71166
Tic. Sic. No: BORN 11910