



EC FERTİLİZER YEDA MIX

Bor(B), Bakır(Cu-Sülfat), Demir(Fe-Sülfat), Mangan(Mn-Sülfat), Çinko(Zn-Sülfat)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

05-11-2015

| Garanti Edilen İçerik | (...w/w): |
|-------------------------------|-----------|
| Suda Çözünür Bor (B)..... | 0.5 % |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0.5 % |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 4 % |
| Suda Çözünür Mangan (Mn)..... | 4 % |
| Suda Çözünür Çinko (Zn)..... | 5 % |

DİKKAT!
KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
DERİ VE GÖZ TEMASINDAN KAÇININIZ.
SADECE İHTİYAÇ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.
ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.

YEDA MIX, bitkideki iz element eksikliklerine karşı kullanılan yüksek kaliteli bir üründür.

KULLANILDIĞI BİTKİLER, KULLANMA DOZU VE ZAMANI:

| Ürün | Yapraktan | Damlamadan | Uygulama Zamanı |
|---|-----------------------------|------------------------|---|
| | Uygulama Doz gr/100lt su | Uygulama Doz gr/ da | |
| Narenciye | 50-100 gr | 100-300 gr | 2 – 3 uygulama tavsiye edilir: 1.uygulama: tomurcuk oluşumunda 2.uygulama: çiçeklenme öncesinde 3.uygulama: meyve tutumundan sonra |
| Meyve Ağaçları | 50-100gr | 100-300 gr | 2 uygulama tavsiye edilir: 1.uygulama: çiçeklenme öncesinde 2.uygulama: çiçeklenme sonrasında |
| Bağ | 50-100 gr | 100-200 gr | 3 uygulama tavsiye edilir: 1.uygulama: ilk yapraktan 15 gün sonra 2.uygulama: çiçek öncesi 3.uygulama : meyve oluşum döneminde kullanılır. |
| Kabakgiller (Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz) | 50-100gr | 100-300 gr | Dikimden 3-4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir. |
| Domates (Sera-Açık Tarla) | 50-100gr | 100-300 gr | Dikimden 3-4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir. |
| Patates- Soğan | 50-100gr | 100-300 gr | Bitkiler 15-25 cm iken veya yumru oluşum döneminde önce 15 gün ara ile uygulamalar yapılır. |
| Çilek | 50-100 gr | 100-200 gr | Dikimden 40-60 gün sonra başlanır. 15 gün ara ile devam edilir. |
| Çiçekler | 100-150gr | 200-500 gr | 2 uygulama tavsiye edilir: 1.uygulama: ilkbahar döneminde 2.uygulama: eksiklik belirtileri ilk görünmeye başladığında |
| Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa,Mısır, Ayçiçeği,Çeltik) | 50-100gr | | Sapa kalkma ve Kardeşlenme dönemi |
| MUZ | | 500gr-1000 gr | Meyve salkımının dogum sürecinden iki ay önce 1ay aralıklarla 2 uygulama |

Kullanma dozları ve uygulama dönemleri iklim koşullarına, bitkilerde iz element eksiliği derecesine ve toprak tipine bağlıdır. Uygun dozlar ve uygulama dönemleri, toprak ve bitki analizlerinden sonra verilebilir.

KULLANIM ŞEKLİ:

Kullanım Sekli ve Zamanı: YEDA MIX, dekar başına tavsiye edilen miktar, meyve bahçelerinde ilkbaharda çiçeklenme öncesi ve sonrasında köklerin bulunduğu toprak üzerine ya da yaprak yüzeyine püskürtülerek uygulanabilir. Yaprak uygulamalarında tavsiye edilen doz, bir miktar suda eritilerek uygulama tankına konulur, uygulama boyunca tank karıştırılmaya devam edilir.

Karışabilirlik: Bir çok suda çözünür gübre ile uyumludur. Yaprak uygulaması için genel uygulamadan önce hazırlanan sprey karışımının küçük bir alan üzerinde test edilmesi tavsiye edilir.

Depolama Durumu: Ürünü sıkıca kapalı pakette muhafaza ediniz. Depolama sıcaklığı :-5°C +30°C

Firma Beyanı: Ürünün ambalajında verilmiş olan bilgiler analizi ile sınırlı olup, kullanımları ise kontrolümüz dışındadır. Bu sebepten dolayı satıcı, kullanımından veya depolanmasından doğan hiçbir zarardan sorumlu değildir. Talimatımız dışındaki kullanımlar için ön deneme yapılması tavsiye edilir.

Bakanlık Lisans No:

Bakanlık Tescil No:

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi :

Şarj No :

NET AĞIRLIK : 1 KG

Üretici Firma:

ASKA Ziraî İlaç San. ve Tic A.Ş.

Kazım Dirik Mah. 184 Sok. No:60/2

35040 Bornova/ İZMİR

Tel: +90 232 343 58 58 Fax:+90 232 342 22 42

aska@askazirai.com / www.askazirai.com

Piyasaya sunacağımız YEDA MIX adlı ürünün etiketinin yoneterligine uygun olarak hazırladığını ve piyasada bu etiketin kullanılacağını beyan eder, aksi takdirde 4703 Sayılı Kanun gereğince yapılacak tüm soruşturma ve cezai müeyyideleri peşinen kabul ederiz.

Tic. Sic. No: BORN 11910